

9 kwietnia 2025

INFORMACJA POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII ws. PRYSZCZYCY

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kozienicach w sprawie pryszczycy

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kozienicach przekazuje informacje dotyczące pryszczycy (FMD), w związku z aktualną sytuacją epizootyczną, związaną z zagrożeniem wystąpienia tej choroby u zwierząt parzystokopytnych na terenie Polski.

Pryszczycyca (FMD) jest wirusową, bardzo zakaźną chorobą zwierząt parzystokopytnych. Chorują najczęściej krowy, świnie, kozy, owce oraz zwierzęta dzikie (np. dziki).

Objawy pryszczycy to: pęcherze głównie w jamie ustnej i na kończynach, obfite ślinienie, mlaskanie, nadżerki i pęcherze, gorączka, spadek apetytu, niechęć do ruchu, kulawizna, spadek mleczności, ronienia. U młodych zwierząt, np. prosiąt, jagniąt, kozłąt, śmierć może wystąpić bez żadnych objawów.

Wirus jest wysoce zakaźny dla zwierząt, łatwo się szerzy i charakteryzuje się dużą odpornością w środowisku. Zakażone i chore na pryszczycę zwierzęta wydają wirus z wydychanym powietrzem, wydzielinami oraz wydaliniami. Głównym sposobem przenoszenia i rozprzestrzeniania się choroby jest kontakt między zwierzętami ale również pasza, ściółka, sprzęt, pojazdy i ludzie, którzy mieli kontakt z zakażonymi zwierzętami. Możliwe jest przenoszenie wirusa wraz z mlekiem, mięsem i innymi produktami pochodzącymi od zakażonych zwierząt. Może wystąpić przenoszenie drogą kropelkową (obecność wirusa w aerozolu).

W celu ochrony stada przez wniknięciem wirusa pryszczycy należy pamiętać, że zwierzęta wprowadzane do stada muszą pochodzić z wiadomego źródła, muszą być oznakowane. W przypadku handlu wewnątrznijnego zwierzęta muszą być zaopatrzone w świadectwo zdrowia potwierdzające ich pochodzenie i status zdrowotny. W przypadku świń świadectwo zdrowia jest wymagane również w obrocie krajowym. **Należy bezwzględnie przestrzegać zasad bioasekuracji.**

W przypadku zauważenia objawów nasuwających **podejrzanie wystąpienia pryszczycy** należy **niezwłocznie zawiadomić powiatowego lekarza weterynarii** bezpośrednio lub za pośrednictwem lekarza weterynarii opiekującego się gospodarstwem lub wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII
W KOZIENICACH

lek. wet. Kamila Kowalczyk-Iwan

CHOROBA

Pryszczycza to choroba bydła, owiec, kóz, świń i innych zwierząt parzystokopytnych (np. jeleni, saren i dzików), która powoduje powstawanie **pęcherzyków i pęcherzy na błonie śluzowej w jamie gębowej, na wargach, języku, w okolicy otworów nosowych oraz na wymieniu, strzykach, w szparze międzyracicowej i na koronkach racic**. Zakażone zwierzęta niechętnie się poruszają, mają podwyższoną temperaturę ciała, obserwuje się apatię, kulawiznę i utratę apetytu oraz spadek mleczności, a u **bydła obfite ślinienie**.

Ciężarne samice mogą ronić, a młode zwierzęta mogą padać bez widocznych objawów klinicznych.



Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Materiał opracowany przez Departament Komunikacji i Promocji (MRiRW), korekta merytoryczna - Departament Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii



PRYSZCZYCA wspólne działanie, wspólne bezpieczeństwo



1 TRANSMISJA

Pryszczycza jest jedną z najbardziej zaraźliwych chorób zwierząt parzystokopytnych. Kontakt między zwierzętami jest głównym sposobem przenoszenia i rozprzestrzeniania się choroby, ale również pasza, słoma, obornik, sprzęt, pojazdy i ludzie, którzy mieli kontakt z zakażonymi zwierzętami mogą przenosić wirusa. Możliwe jest przenoszenie pryszczycy wraz z mlekiem, mięsem i innymi produktami pochodzącymi od zakażonych zwierząt, które nie zostały poddane obróbce niszczącej wirusa tej choroby.



2 ZAPOBIEGANIE

Wprowadzanie do gospodarstwa zwierząt o nieznanym stanie zdrowia stanowi bardzo duże zagrożenie dla całego stada. Większość środków zapobiegawczych jest wspólna dla różnych chorób i jest najlepszym i najtańszym sposobem ochrony stada.

UNIKAJ:

- Zakupu zwierząt niezidentyfikowanych, pochodzących z niewiadomego źródła;
- Kontaktów między zwierzętami z różnych stad (np. na pastwisku, kontakt nos w nos przez ogrodzenie);
- Odwiedzania innych hodowli zwierząt bez zachowania zasad bioasekuracji;
- Wspólnego używania narzędzi, sprzętu i pojazdów wykorzystywanych w innych gospodarstwach.



STOSUJ:

- Oddzielne miejsca do izolacji i obserwacji przez 14 dni każdego nowo zakupionego zwierzęcia;



- Odzież i obuwie ochronne do obsługi zwierząt;
- Niecki, maty lub urządzenia do dezynfekcji obuwia przy wejściu do budynków inwentarskich oraz mycie i dezynfekcję rąk.

3 ŚWIADOMOŚĆ

Choroba może powodować bezpośrednie i pośrednie straty ekonomiczne, a stado może być zagrożone. Bardzo ważny jest nadzór nad zdrowiem zwierząt. Każde podejrzenie pryszczycy należy niezwłocznie zgłosić służbom weterynaryjnym. Powiadomienie jest obowiązkowe i ma zasadnicze znaczenie dla szybkiego zdiagnozowania choroby.